

INTRODUÇÃO

A fissura labial e a fenda palatina, conhecidas popularmente por vários nomes como lábio leporino e goela de lobo são malformações congênitas de apresentação variável, que ocorrem durante o desenvolvimento do embrião. O primeiro desafio que as crianças têm ao nascer com uma malformação congênita é de sofrer interferências em seu dia-a-dia (ARARUNA; VENDRÚSCOLO, 2000), a maior é a dificuldade para alimentar-se, podendo ocasionar desnutrição, anemia, pneumonia aspirativa e infecções de repetição (RIBEIRO; MOREIRA, 2005).

FISSURA LABIAL E FENDA PALATINA

Essa falha no fechamento das estruturas pode restringir-se ao lábio ou estender-se até o sulco entre os dentes incisivo lateral e canino, atingir a gengiva, o maxilar superior e alcançar o nariz. Na fenda palatina, a abertura pode atingir todo o céu da boca e a base do nariz, estabelecendo comunicação direta entre um e outro, podendo, ser responsável pela ocorrência de úvula bífida.

Há diversas classificações das fissuras labiopalatinas, tomando com base aspectos morfológicos e/ou embrionários. A mais utilizada no Brasil é a formulada por Spina et al. (1972), que tem como referência anatômica o forame incisivo e o limite entre o palato primário e o secundário.

Os diagnósticos de enfermagem possíveis para uma criança portadora da patologia são: deglutição prejudicada, nutrição prejudicada, risco de broncoaspiração, dentição prejudicada, mucosa oral prejudicada, enfrentamento familiar comprometido, sofrimento espiritual, interação social prejudicada, risco de sufocação, risco de baixa autoestima situacional.

TRATAMENTO

As fissuras labiopalatinas não são alterações de caráter estético apenas, tratamento é de abordagem multidisciplinar e deve ser iniciado o quanto antes, a partir dos 3 meses do bebê. Para a fenda palatina é indicada a cirurgia a partir dos 18 meses. A cirurgia tem como objetivo uma reabilitação morfológica, funcional e psicossocial do paciente.

CUIDADOS GERAIS COM O BEBÊ ANTES E APÓS A CIRURGIA

Alguns cuidados especiais são necessários como: o recém-nascido deve ser amamentado ou alimentado na posição semi-sentada. Nunca com a cabeça deitada para que os alimentos ou o leite volte pelo nariz, deve-se fazer paradas durante as mamadas, para que o bebê

descanse. Depois da mamada, o bebê deve ficar sempre com a cabeça mais elevada, devido a regurgitação. A limpeza da região bucal, deve ser obrigatória antes e depois da mamada, com gaze molhada em água filtrada. É recomendado a realização da higiene da boca e do nariz com astes flexíveis umedecidas em água filtrada, antes e depois da alimentação. Após a cirurgia, a dieta deve ser apenas líquida e pastosa e a amamentação deverá ser feita após 1 semana, para evitar que os pontos se abram. A ida ao dentista após a cirurgia é importante, pois será feita avaliação para saber se ainda precisará passar por outra operação como cirurgia dentária ou uso de aparelhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que haja um tratamento eficaz, é necessário que seja feito por uma equipe multidisciplinar envolvendo ginecologista obstetra, geneticista, cirurgião plástico, pediatra, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo e odontólogo (RIBEIRO; MOREIRA, 2005). A enfermagem é parte dessa equipe, atuando no processo de reabilitação, tendo como objetivo integrar o paciente para assegurar a continuidade do tratamento.



FONTE: POÇAS, 2014.

REFERÊNCIAS

- IMAGEM: POÇAS, A. M. Afinal, o que é a fissura labiopalatina?!. 2014. Disponível em: <<https://fissuradanamaternidade.com/2014/10/30/afinal-o-que-e-a-fissura-labiopalatina/>>, acesso em 09 mar 2019.
- BATISTA, L. R. V.; TRICHES, T. C.; MOREIRA, E. A. M. **Desenvolvimento bucal e aleitamento materno em crianças com fissura labiopalatal**. Revista Paulista de Pediatria, v. 29, n. 4, p. 674-679, 2011.
- BLOG: <https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/labio-leporino-fissura-labial-e-fenda-palatina/>. Último acesso em: 05/09/2019.
- BLOG: Dr. Emilio Valls, Cirurgião. <https://www.tuasaude.com/cirurgia-para-labio-leporino-e-fenda-palatina>. Atualizado em Abril 2019 Último acesso em: 05/09/2019.